Guia Completo de Manejo

Goiaba: como afastar a mosca-das-frutas e colher mais cedo



ESTERCO TURBINADO

Adubo orgânico enriquecido — Turbinado & Frutífera

Neste guia

1. Goiaba: fácil de cultivar, difícil de proteger
2. Enxertada x pé-franco x semente
3. Escolha do local e plantio
4. Poda: formação, condução e limpeza
5. Calendário de adubação
6. Mosca-das-frutas: o problema número um da goiaba
7. Raleio: menos fruto, mais qualidade
8. Outras pragas e doenças
9. Colheita
10. Sintomas rápidos: o que fazer
11. Fale com a gente

1. Goiaba: fácil de cultivar, difícil de proteger


A goiabeira (*Psidium guajava*) é nativa do Brasil, rústica, cresce rápido e se adapta bem a quase qualquer solo, desde que drenado. É uma das frutíferas mais fáceis de estabelecer no quintal ou na chácara. O desafio dela não é crescer — é chegar fruto inteiro até o prato, porque a goiaba é o alvo preferido da mosca-das-frutas, o famoso "bicho da goiaba".

Esse guia foca exatamente nisso: como afastar a mosca-das-frutas, além do manejo completo de poda e adubação pra colher mais cedo e com mais qualidade.

Vale saber de cara

Grande parte das pessoas que desiste da goiaba não é por causa de a planta não produzir — ela produz fácil. É porque a fruta vem toda furada e estragada por dentro. Esse problema tem solução simples e barata, explicada na seção 6.

2. Enxertada x pé-franco x semente



Tempo até a primeira frutificação, conforme a origem da muda.

Muda enxertada frutifica bem mais cedo e garante a mesma fruta da planta-mãe. Semente é mais lenta, e não garante nada — a fruta pode sair diferente da que originou a semente, porque a goiaba não repete fielmente as características da matriz.

3. Escolha do local e plantio

Sol: pleno sol, no mínimo 6 horas diretas por dia.

Solo: bem drenado, rico em matéria orgânica. Goiabeira tolera solo pobre, mas produz muito mais em solo bem preparado.

Cova: 50x50x50cm, com Esterco Turbinado bem incorporado à terra de preenchimento.

Espaçamento: 4 a 6 metros entre plantas, dependendo da variedade — algumas cultivares copam bastante.

4. Poda: formação, condução e limpeza

A goiabeira frutifica em **brotação nova**, então a forma como ela é podada interfere direto no ritmo da colheita — sem poda nenhuma, a planta ainda produz, mas de forma desorganizada e com fruto menor.

- **Poda de formação:** nos primeiros anos, para estruturar a copa e definir os ramos principais
- **Poda de frutificação:** feita anualmente, geralmente no fim do inverno, estimula brotação nova (onde nasce a flor) e mantém a copa aberta
- **Poda de limpeza:** contínua, remove galho seco, doente ou mal posicionado
- **Mantenha a copa arejada:** copa muito fechada é ambiente ideal pra fungo se instalar

5. Calendário de adubação

Estágio da planta	Produto recomendado	Frequência
No plantio (na cova)	Esterco Turbinado	1x, no plantio
Formação (até 2 anos)	Esterco Turbinado 4kg	A cada 45-60 dias
Pré-floração	Trocar para Esterco Frutífera 4kg	Reforçar aplicação
Floração e frutificação	Esterco Frutífera 4kg	A cada 45-60 dias
Após poda anual	Esterco Turbinado 4kg	Uma aplicação, para puxar a rebrota






Turbinado na formação; Frutífera, com mais fósforo e potássio, na fase de floração e fruto.

6. Mosca-das-frutas: o problema número um da goiaba

A mosca-das-frutas é uma família de insetos que faz a postura de ovo dentro do fruto ainda na planta. O ovo vira larva, a larva se alimenta da polpa por dentro, e o resultado é a goiaba que parece boa por fora e vem toda estragada quando corta.



Ensacamento: a barreira física que resolve o problema na causa.

As três camadas de defesa que realmente funcionam, juntas:

- **Ensacamento do fruto** — quando ainda pequeno, envolver cada fruto (ou cacho) num saquinho de papel, TNT ou organza. É a proteção mais eficaz que existe, porque impede fisicamente a mosca de chegar no fruto pra depositar o ovo
- **Armadilhas com atrativo** — garrafa pet com furos e isca (suco de fruta fermentado, ou atrativo comercial) capturam mosca adulta antes que ela chegue no fruto, reduzindo a população no pomar
- **Pomar limpo** — recolher e destruir todo fruto caído ou estragado no chão diariamente durante a safra. Fruto caído é onde a larva completa o ciclo e vira mosca nova — deixar no chão é multiplicar o problema pra próxima safra

Por que a nutrição também ajuda aqui

Planta bem nutrida e bem podada produz fruto mais uniforme e num período mais concentrado — isso facilita fazer o ensacamento e a colheita de uma vez, em vez de fruto amadurecendo aos poucos e ficando exposto por mais tempo no pé. Manejo nutricional em dia não substitui o ensacamento, mas torna ele mais fácil de aplicar na prática.

7. Raleio: menos fruto, mais qualidade

Quando a goiabeira começa a frutificar, é comum nascer um cacho de vários frutos pequenos juntos no mesmo ramo. O raleio é retirar parte deles ainda verdes e pequenos, deixando só 1 ou 2 por ponto — os que sobram crescem maiores, mais doces e com casca mais bonita. Faça o raleio na mesma época do ensacamento, já que os dois cuidam do fruto ainda em formação.

8. Outras pragas e doenças

Problema	Como identificar	O que fazer
Ferrugem	Pústulas alaranjadas na face inferior da folha e no fruto novo	Poda de ventilação, recolher folha caída, calda bordalesa em caso severo
Antracnose	Manchas escuras afundadas no fruto maduro	Poda de limpeza, evitar molhar a folhagem na rega
Cochonilha	Casquinhas brancas/acinzentadas em ramo e folha	Remoção manual em foco pequeno; controlar formiga associada
Broca-do-tronco	Serragem saindo de furo no caule, galho murchando	Remover galho afetado; óleo de neem como preventivo
Gorgulho-da-goiabeira	Pequenos furos no fruto ainda verde, semelhante à mosca mas outro inseto	Mesmas defesas do item 6: ensacamento e pomar limpo

9. Colheita

A goiaba amadurece rápido depois que muda de cor — por isso a colheita precisa ser frequente durante a safra, idealmente a cada 2 a 3 dias, e não deixada pra uma vez por semana. Colha quando a casca começar a clarear (de verde-escuro pra verde-claro, amarelo ou rosado, dependendo da variedade) e o fruto ainda estiver firme ao toque, não mole. Fruto colhido cedo demais não amadurece bem depois de solto do pé.

10. Sintomas rápidos: o que fazer

Sinal	Causa provável	O que fazer
Fruto com furo pequeno e polpa estragada por dentro	Mosca-das-frutas ou gorgulho	Ensacar os frutos da próxima safra e manter armadilhas
Pústulas alaranjadas na folha	Ferrugem	Poda de ventilação, remover folha caída, calda bordalesa se necessário
Manchas escuras afundadas no fruto maduro	Antracnose	Poda de limpeza e evitar molhar a folhagem
Fruto pequeno e pouco doce	Excesso de fruto no mesmo cacho, ou falta de potássio	Fazer raleio; reforçar Esterco Frutífera
Planta cresce bem mas floresce pouco	Falta de poda de frutificação, ou excesso de nitrogênio	Fazer poda anual; garantir troca para Esterco Frutífera na fase de floração

---

11. Fale com a gente

Goiaba é generosa e cresce fácil — o segredo pra colher fruta boa é a defesa certa contra a mosca-das-frutas e a poda em dia. Se sua goiabeira está sofrendo com fruto furado, ou quiser montar o calendário certo pro seu pé, chama a equipe **Esterco Turbinado** no WhatsApp.

Esterco Turbinado
gabriel-gatti.com | Shopee: br.shp.ee/Wi5nKcY5 | Fale conosco no WhatsApp

CNPJ 66.116.356/0001-01 — Esterco Turbinado, adubo orgânico enriquecido.